GenSci
金赛药业

核准日期：2024年02月29日

金赛欣

黄体酮注射液(II)说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：黄体酮注射液(II)

英文名称：Progesterone Injection (II)

汉语拼音：Huangtitong Zhusheye (II)

【成分】

本品主要成分为黄体酮

化学名称：孕甾-4-烯-3，20-二酮

化学结构式：



分子式：$C_{21}H_{30}O_2$

分子量：314.47

辅料：羟丙基倍他环糊精、注射用水

pH值：6.0~8.0

渗透压摩尔浓度：270~320mOsmol/kg

【性状】

本品为无色的澄明液体。

【适应症】

用于辅助生殖技术(ART)中黄体酮的补充治疗。

适用于不能使用或不能耐受阴道制剂的女性。

【规格】

1.112ml : 25mg

【用法用量】

皮下或肌肉注射。从取卵当天开始每日注射一次25毫克，通常持续到妊娠7周。

本品由患者本人在接受指导后可以进行皮下注射或前往医院进行肌肉注射。

【不良反应】

下表展示了在临床试验期间接受黄体酮注射液报告的主要不良反应。数据以系统器官分类(SOC)和频率表示。

SOC	非常常见 (≥1/10)	常见 (≥1/100,<1/10)	偶见 (≥1/1000,<1/100)
精神病类			情绪波动
各类神经系统疾病		头痛	头晕
胃肠系统疾病		腹胀、恶心、呕吐、腹痛	胃肠不适
皮肤及皮下组织类疾病			皮疹
生殖系统及乳腺疾病	子宫出血、阴道出血	乳房痛(乳房发胀、乳房肿胀、乳房压痛、外阴阴道瘙痒、外阴阴道瘙痒、乳房不适、乳房增大、乳房触痛、乳房结节、乳房疼痛、乳房增大、乳房不适、乳房疼痛、乳房结节、乳房触